

V PŘÍPADĚ

INVAZIVNÍHO MENINGOKOKOVÉHO ONEMOCNĚNÍ

JDE O MINUTY.
MĚJTE NÁSKOK.
MYSLETE NA BEXSERO.

Využijte příspěvku
pojišťovny
až 2 500 Kč!

Výše příspěvku a podmínky
pojištění se liší*

MENINGOKOKOVÉ ONEMOCNĚNÍ:

Je neobvyklé, ale závažné onemocnění způsobené bakterií *Neisseria meningitidis*. K invazivnímu meningokokovému onemocnění (IMO) dochází, když se bakterie rozšíří do těla a způsobí závažné infekce. Většina případů IMO v České republice byla v posledních letech způsobena kmeny séroskupiny B.


MENINGITIDA – Infekce blan, které obalují mozek a míchu.

SEPSE – Otrava krve.



MŮŽE POSTUPOVAT VELMI RYCHLE

Meningokokové onemocnění se může rychle rozvinout z počátečních nespecifických příznaků a končit až smrtí během 24–48 hodin.



MŮŽE MÍT VÁŽNÉ NÁSLEDKY

KAŽDÝ PÁTÝ PACIENT, KTERÝ NEMOC PŘEŽIJE, ZŮSTANE DLOUHODOBĚ POSTIŽEN. Nemoc může způsobit trvalé POŠKOZENÍ MOZKU, NEDOSLÝCHAVOST, PORUCHY UČENÍ a někteří pacienti musejí podstoupit AMPUTACI.



JE V POČÁTCÍCH OBTÍŽNĚ
DIAGNOSTIKOVATELNÉ



BEXSERO

vakcína proti meningokokům skupiny B
(rDNA, komponentní, adsorbovaná)



MENINGOKOKOVÉMU ONEMOCNĚNÍ

LZE PŘEDEJÍT

Očkování je efektivní způsob, jak můžeme pomoci předcházet meningokokovému onemocnění.

Doporučuje se zejména u MALÝCH DĚTÍ, DOSPÍVAJÍCÍCH A U OSOB S OSLABENOU IMUNITOU.

Využijte příspěvku
pojišťovny
až 2 500 Kč!

Výše příspěvku a podmínky
pojištění se liší*



BEXSERO

Očkování proti **NEJROZŠÍŘENĚJŠÍ SÉROSKUPINĚ B** vakcínou **BEXSERO** je k dispozici **OD 2 MĚSÍCŮ VĚKU** dle následujícího očkovacího schématu:

Věk v době první dávky	Základní očkování	Interval mezi dávkami	Posilující dávka
2–5 měsíců	3 dávky	≥ 1 měsíc	1 dávka ve věku 12–15 měsíců
3–5 měsíců	2 dávky	≥ 2 měsíce	
6–11 měsíců			
12–23 měsíců			1 dávka v druhém roce života > 2 měsíce mezi primární sérií a posilující dávkou
2–10 let		1 dávka s prodlevou 12–23 měsíců po dokončení základního očkování	
11 a více let		≥ 1 měsíc	Potřeba nebyla stanovena

Podobně jako ostatní vakcíny ani přípravek Bexsero nemusí chránit 100 % očkovaných osob. Pečlivě si přečtěte příbalovou informaci vakcíny dostupnou také na stránkách www.sukl.cz a www.gskkompendium.cz.

Bexsero je vakcína proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému meningokokem skupiny B. Neočekává se, že přípravek Bexsero zajistí ochranu proti všem kolujícím meningokokovým kmenům skupiny B. Vakcína Bexsero je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Vakcinační akce schválená Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZDR 59391/2017-11/OVZ). Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Očkování provádí lékař injekcí do svalu. O očkování se poraďte s lékařem Vašeho dítěte.

* Např. VZP přispívá dětem do 18 let na očkování proti meningokokovým nákazám až 2 500 Kč.

NEČEKEJTE!

OBJEDNEJTE SE NA OČKOVÁNÍ JIŽ DNES!

www.meningokoky.cz



GlaxoSmithKline s.r.o.,
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4, Česká republika
tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444
e-mail: cz.info@gsk.com, www.gsk.cz.

CZ/BEX/0017/18a(1)
Schváleno: červen/2018